

EL USO DE SUSTANCIAS EN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

LAS DIFERENCIAS EN EL TRASTORNO DEL CONSUMO DE LA MARIHUANA

LAS MUJERES

- ◆ desarrollan el trastorno más rápidamente¹
- ◆ más trastornos de la ansiedad²
- ◆ más ataques de pánico²

LOS HOMBRES

- ◆ trastorno más severo¹
- ◆ más trastornos de personalidad antisocial²
- ◆ más problemas con el uso de otras sustancias²

MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN PARA EL DOLOR

Las mujeres son menos probables de mal usar o abusar los medicamentos de prescripción para el dolor.³

4
MILLONES

mujeres reportan el mal uso en el año pasado.

5
MILLONES

hombres reportan el mal uso en el último año.

EL TRATAMIENTO PARA EL MAL USO DE LOS MEDICAMENTOS ASISTENTES PARA DORMIR

Las mujeres son más probables de buscar tratamiento para el mal uso de los barbitúricos.⁴

55%


de las admisiones a centros de tratamiento en el último año para el mal uso de los barbitúricos son **mujeres**.

45%

de las admisiones a centros de tratamiento en el último año para el mal uso de los barbitúricos son **hombres**.

DEJAR LA NICOTINA

Las opciones para el reemplazo de la nicotina, como el parche y el chicle, son menos eficaces para las mujeres que para los hombres.⁵



Las frecuencias de dejar la nicotina después de 6 meses en el parche